

2. VE 3. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA  
**VAKA YÖNETİMİ AKIŞ ŞEMASI**

**ATEŞ VE/VEYA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU  
BULGULARI (ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI) VAR MI?**

**EVET**

**HASTAYA TIBBİ MASKE TAKILARAK  
DİĞER HASTALARDAN AYRI BİR MUAYENE BİRİMİNE ALINIR.**

**COVID-19 OLASI OLGU TANIMINA UYUYOR MU?**

**EVET**

**BAŞVURDUĞU HASTANEDE, BU HASTALAR İÇİN  
DAHA ÖNCE BELİRLENMİŞ OLAN BİRİMDE/ALANDA  
İZOLE EDİLİR. DAMLACIK VE TEMAS İZOLASYON KURALLARI  
UYGULANARAK İZLENİR.**

**HASTADAN COVID-19 REHBERİ'NE GÖRE  
SOLUNUM YOLU ÖRNEĞİ ALINIR.**

**Örnek Negatif**

**Örnek Pozitif**

Alternatif tanıya yönelik tedavi verilir

COVID-19 tanısı ile güncel literatürdeki ve  
COVID-19 Rehberi'ndeki bilgiler ışığında uygun  
şekilde tedavi edilir

Tedaviye rağmen semptomlarda  
48 saat sonra düzelme

**Var**

**Yok**

Kesinleşen olgulardan  
yoğun bakım ihtiyacı  
olan veya entübe  
edilen hastalar 2.- 3.  
düzey yoğun bakım  
ünitelerinde izolasyon  
odalarında takip edilir

Alternatif tanıya  
yönelik tedavi  
verilerek evde 14  
gün süre ile  
izolasyona  
devam etmek  
kaydı ile taburcu  
edilir

Hastadan ikinci  
defa COVID-19  
tanısı için 2. örnek  
gönderilir.

**Örnek Pozitif**

**Örnek Negatif**

İyileşen hastalarda taburculuk için en az 24 saat  
arayla alınan iki solunum yolu örneğinin negatif  
sonuçlanması beklenmelidir.

COVID-19 dışlanır,  
hastalığına yönelik  
tedavi edilir.